Quelle: https://manuscripta.at/?ID=128
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



mterum. Hoc quare ⁊ quare nascunt ex
indemonstrabili qrto ꝗsis ponib; eorũ.
Sexto aũ mod nec utq; nec alta redigi o
uersa ad indemonstrabile aliquẽ p. S; pi
pos. uũ approbaõ sicut qrd i ea formu
la. Ideoq; utreq; nouissimi noãnt. Ceterox
aũ in oib; formulis ordinato facta ⁊ p
diffũ ouganonũ ⁊ illationũ. Nã p fit
declinare qm negare potentq; ⁊ uni
ũsale q parte. Priores eni sũt uniũsales
partib; ⁊ in utrisq; dedicato ⁊ illato si
miles sunt ⁊ hic ꝓpoũ mod qui ceteri
ad indemonstrabile redigũt. i. una ꝗsio
ne. q una ꝓbatio ⁊ cetos eos ab ocluden
dũ modus ee. Est alta ꝓbatio innuis
⁊ indemostrabiliũ q dr ipos. appellat q: a sto
icis ꝓma ostruto ꝑ ꝓmũ expositũ qd sic
diffiniũt. Si ex duob; tũ quid colligt
alterũ eox cũ ꝗsis illationis colligit et
rũ relinquit. Ceteri aũ sic diffiniertũt
Cis oclonis si sublata sit illatio assupta al
terũ poe tolli reliqm. Que res inuenta ⁊ ad
uersus eos qui cessit acceptionib; id qd eritt
colligt inpudent recusant. Pl ij. ꝗpellun
t ad impossibilia dũ ex eo qd negant ꝗsis
aliquid inuenient et qd aũ cesserunt. Por
ro ꝗta simt ee ua ipos ⁊. Q ꝓpassibile
ꝗpellunt ad oclone. nec frustra dialecti
ci ostituert eũ unũ modũ ee d adusũ il
lationis e alta acceptione tollit reliqm
Ar stoici q tm nega partcla ꝓposita pu
tant illationẽ recusari t ex ponib; alterã
tolli. Vt puta cis. n cis. Ceteri ũ ꝗpaluũtm
bifariã. Vt puta cis. n cis. qdã n qdã. fiunt
g adusus una qmq; oclone hie q oppo
nat octo qm utq; acceptio bifariã tollit
fiunt q; oclones bis qtne. m nega partcla
ꝓposita illationi. m alatt illationis accep
ti. Exemplo sit pns indemonstrabilis. Oe
tũ honestũ. Oe honestũ bonũ. Oe g tũ bo
nũ. Hac illationẽ cessis ponib; negat:
necee ⁊ dicat. Qdã tũ n ⁊ boũ hnc si ꝓpo
nat poe ex. ii. cessis. Oe honestũ nstũ ⁊ fit
illatio sdm sexũ modũ i cta formula.
Qdã g honestũ n ⁊ boũ. Qd repugnat
sde pomi q cesserat. Oe honest boũ. Sce
h oio opposita ⁊ oclo. si rsd manentib; eq
pollente et inferat. Vt. tũ g oe honestũ
boũ. Similit ⁊ alte fiant due oclones sic
ne ꝓpositni poe pone. sic assumam p
ceroe. Qdã tũ no ⁊ boũ. oe honest boũ.
fit illatio. uũ. mi i sda formula duplex.
tũ g oe te honest. t qdã g tũ boũ n ⁊. Qua
rũ uũus eq pon poi repugnat q cesse
rat. Oe te honest. His oclonib; manentu
b; tm po mutata ⁊. Si p eo qd erit. ad
dã te n ⁊ boũ. fiat nõ oe nstũ boũ. Vt
bifariã sit sublata illatio. Cr alte. uũ. oclo
nes rsd mutationib; Ne si p eod fiat. tũ
lũ te boũ: bifariã sit sublata illatio. Cir
tne. uu. oclones dũtaxat. i bis q habebũt
uniũsale illationẽ. Ca eni p sola tfariã
tolli. Ar i ceris sole. vm. qs siqs nelit sin
gillatim sub uno q; p os formulas potit
suggerere ad exemplũ qd ꝓpositũ ut
ꝓpositorum more plurias ordine ꝓponũ