Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

continuentur duo signa que ambo sunt a' a duabus partibus aquinoctii
duorum punctorum tropicorum a' a duobus partibus eadem dist punctorum duarum
equalitatum · diuersitas aut q̃ erit inter vtrumque eorum q̃ sunt ambos tropicos
et inter tpus equale erit · e · tpa et dimidium tpis fe' Sed diuersitas que
erit inter vnumquodq; eorum que sunt ambas q̃litates et inter vnumquemq;
eorum que sunt apud duos tropicos et inter tpus equale erit q · tpa Vnum
namq; eorum minuit ex tpe equali et aliud addit super ipsum quantum est q
minuit primum Quapropter posuimus inter dierum et noctium in equatione
computationis locorum stellarum a medio celo et id ab elevationibus solis neq;
occasibus sinus Diuersitas namq; q̃ inducitur apud orizontem possibile est ut
sit in horis solis et non sit illud in omni loco diuersificat namq; id
cum diuersitate augmenti dieum et diminuendo eius in vnaq̃q; declinationum
speci Diuersitas vero que est in medio celi est vna in omni loco neq; au-
getur eius diuersitas super id quod aggratur de tpibus que aggrant ex diu-
sitate solis et elevationibus celi medii et plurimum diuersitatis q̃ erit ex aggrauo
horum duorum modorum simul quorum diuersitas est que est per solem et ea q̃ est per
medium celum erit in duabus longitudinibus in quibus est diuersitas q̃ est horum
duorum modorum a' cum augmento simul aut cum diminuendo simul loco autem
diminutionis est a medietate aquarii usq; ad finem libre et locus augmen-
ti a principio scorpii usq; ad medietatem aquarii Apparet ergo q̃ plurimum q̃ ad
dictum vnaq̃q; harum duarum partium aut minuit per diuersitatem solis et tertia tpa
et duo tertie tpis et per medium celum e · tpa et duo tpis fe' dou' sit plurimum
quod aggratur ex diuersitate dierum cum noctibus sinus aggrant ex duobus
modis simul in vnaq̃q; duarum partium Quod at inter ipsam et inter me-
dium est vnum · tpa et tertia tpibus que sunt medietas vnius hore et vna is
parium hore Quod aut est inter dies cum noctibus sinus augmentatos et di-
minutos duplum illius ib tpe et duo tertie tpis que est vna hora equal' et
nona hore Hec vero q̃litatis cum dimissa fuit in solem et stell' eius aliquo
cuenit per eius dimissionem q̃litatis sensibil' in assicendo eorum in alio corpo
que inducitur in luna a' per velocitatem sui cursus sit diuersitas manifesta
sensibilis si est quasi tertia q̃te vnius partis Adhuc aut ubi posuimus
dies cum tertia cum noctibus tpales diuersos datos qui sunt in q̃libus duarum medie-
tatum duarum longitudinum s · q̃ sunt a medietate diei a' a medietate noc-
tis usq; ad medietatem diei a' usq; ad medietatem noctis fuerunt cos di-
es medios cōples Considerabimus q̃ta sit longitudo dierum cum sinus noctibus q̃ est
inter primum locum notum in quo fuit sol et inter locum eius 2m ad quem pruenit
et in quo loco pcm orbis signorum fuit et ad q̃ pruenit per cursum medium
et per cursum diuisum Deinde ponimus assimilando quod ex partibus erit in duo
loca primum solis diuisum qui inducitur Et mittemus eas in tabulas cle-
nationum sicut recte Et considerabimus q̃ tpa elevationis diei q̃libus celum mediat
sunt coram ipsis Deinde assumemus superflum quod erit inter illa tpa in-
uenta et inter ptes motus medii et indebitum Quantitas illius superflui quam sit