Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift



159

quia sequitur dies 20 secundum eius Et fuit stella veneris in mane
sup plinum quod est longitudo eius a sole minuta postior stella.
que est in extremitate ale meridionali virginis secundum quantitatem
longitudinis plaud aut minus eo parum secundum quantitatem stelle ipsius
et visus eius cursus at si est ipse determinatus in medio secundum quanti-
tatem dyametri lunaris vnus et quinque stelle fixe apparuerunt fuit
locus in illa hora sup 28 partes et medietatem et tertia partis leonis
sta quod fuit stelle veneris locus sup tertia partis vnus virginis Et fuit locus solis per tut sui sum medium sup 18 partes et me-
dietatem et tertia partis et 30 partis vnus libre Ergo fuit plinum
quod est longitudinis eius naturalis a cursu medio 28 partes.
et medietas et per 30. partes et considerauimus nos in anno 21 an-
norum Adeuam in mense viridato apud egyptios machme in die no-
no eius In prima hora noctis quia sequitur dies 10 stella veneris
et fuit in plinio quod est longitudinis eius a sole et minuimus
ea precedentem stellas septentrionales stellas IIII que sunt quasi
in gradibus post stella sequentes que est sup rectitudine altior
partis aquarii duabus partibus fere lunae lij. et fuit stella visa ac
si ipsa scintillauit Et quinque stelle fixe fuit locus in illa hora
secundum inclinationem ecliptice sup 20 partes aquarii Et per illud fuit
stella veneris sup 19 partes et 3. quintas partis eius Et fuit
locus solis per cursum sum medium sup duas partes et partem 14. partis
vnius capricorni tunc fuit in hac consideratione etiam longitudo
que est longitudinis eius vespertine 28 partes et medietas et
et 30 partes partis vnius et duo puncta orbis signorum que sunt in
medio inter 18 parte et medietate et tertia partis et partem 31.
partis vnius libre quod fuit locus solis in consideratione prima et inter
duas partes et partem 14. partis vnius capricorni que fuit loca
solis in consideratione secunda cadit etiam sup partem 24 scorpionis
et thauri Capitulum 25 In quantitate orbis revolutionis stelle Ve-

Declinatio veneris minuendo et longitudo longior veneris
et longitudo prior eius orbis egredietur tunc in medietate
e sup 24 gradus thauri et scorpionis postea sequenti si-
mus illud secundum quod oportet et minuendo longiore longitudo que fuit
eius a sole cum fuit per motum sum medium in 24. partibus thauri et
in 24. partibus scorpionis Et inuenimus in considerationibus quas peruenie-
runt ad nos de quadratibus Tarenis quadratis que fuit in anno
12 annorum adeuam in mense athyra apud egyptios in matutino
diei tertie in quo inuenit stella veneris in plinio quod est longitudinis eius
a sole et precedebat lucida certa que tunc est per stellam antecedentem tunc stel-
las quas fuit in capite arietis et per stellam que est sup pedem eius post-
minus parte vna et duabus quintis partis et fuit longitudo eius a stella