Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

egredientis centri maioris egressionis a centro eius. tri acceptio e
sedm rem simplicem et sicut si centrum orbis revolutionis moveretur sup
orbem ipsum egredientis centri. Et tabula quarta est ea que comp-
hendit superfluitatem que aggregatur ex additionibus et diminutionibus
prea qm centrum orbis revolutionis non sup hunc orbem eius pressit nar-
rato revolutur. sz sup alterum. Modus autem quo invenient magnitudines ha-
eum duarum rerum simul et singulariter sedm viam linearum in lecuter
stetur p figuras ples quas premisimus et posuimus in loco alio ab
isto quia intendimus figurare has duas intentiones in libro Melius ig
nobis est. ut sciamus hanc equationem diversitatis compete ad orbem
signorum visibiliter et ideo posuimus eam in duabus tabulis Quod tri tu
ncte esset p ipsum opacum et agere contenti ceiung tabula una et e ea
que est comprehendit augmentum et diminutum mixta in hys duabus
tabulis tecum aut tabularum que secunde has duas quoque compre-
hendit augmenta et diminutiones que sunt pp orbem revolutionis.
et iste etiam sunt accepte sedm rem simplice et sedm qm in longitudine
longiore et longitudine propinquiore magnitudinum eorum non operatur nisi sedm
duas longitudines a visibus nrae et sedm qm modus in declinatione eius
etiam iam facilius fiatur p figuras quas nos prius posuimus et tabula
media harum duarum tabularum et est septa a prima tabula comprehendit augm-
menta et diminutiones que aggregantur sedm longitudines medias Mix-
ta vero comprehendit summam superfluitatis que est in diversibus sitibus
illis eisdem inter augmenta et diminutiones in maiori longitudine et mixta in
longitudine media Tabula vero. v.ma comprehendit summam superfluita-
tis que e inter augmenta et diminutiones in minori longitudine mixta in lon-
gitudine media Nos enim iam demonstravimus qm sedm partes quibus linea
que est a centro orbis revolutionis que e stelle saturni quide e namque
melius inter ut incipiamus a superiori e 6. ptes et 30. min et stelle Jovis
11. partes et 30. min et stelle martis 39 ptes et 30. min et stelle veneris
12 partes et 10. min et stelle mercurii 22 ptes et 30. min et longitudo
earum media 60. ptes sz longitudo que reperitur p compatem ad li-
neam egredientem a centro orbis egredientis centri descendentem orbis
revolutionis et qm minor longit. eorum sedm centrum orbis signorum est stel-
la quide saturni e 62. ptes et 24. min Et in stella Jovis est 62. ptes
et 24. min. Et in stella martis 66 ptes et in stella Veneris 61 ptes
et 14. min. et in stella mercurii 69 ptes et qm minor longit. sedm id
exemplum in stella saturni est 46 ptes et 34 min Et in stella Jovis.
45 ptes et 14. min Et in stella martis 42 ptes et in stella veneris
48. ptes et 24. min Et in stella mercurii. 44. ptes et 32 min Tabu-
lam aut sequente eas et est octava ordinamus qm ex ea similiter
ptes que ptinet superfluitatibus quas narravimus cum no finit orbes
revolutionis stellarum in alia longitudine media a maiore a minore.