Quelle: https://manuscripta.at/?ID=886
Copyright: Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift

p eos sup arcus qui sunt aput longit ppinquore orbis egredientis
centri ad cursus qui sunt p eos sup arcus qui sunt aput longit
ppinquorem eius sicut ppor. u. pcm fere ad q. ptes duo vero arcus
d e et n b. sunt equales ergo ppor. angli g e b ad anglm d e b. erit
sicut ppor. u. pcm ad q. ptes Quapp. ppea q duo angli a e b et
b e b. sunt noti et q ppor. angli g e b ad anglm d e b. est nota et q an-
gulus a e g est equal anglo b e d. si nos considerauim ota ps sit
superfluitas inter duas summas duarum quantitatum superfluitatis inter du-
os minos ppoerius et accepimus silem illi pti ex minoribus duo-
rum ppoerius pueniet nobis summa duarum earumdem quantitatum inter
quas ppe cerdit ppoerio Et illud manifestum est p vnum caplorum
maliu vna. n. duarum quantitatum est e. ptes et tertia ptis et alte-
ra l. ptes et superfluitas inter eas est due ptes et due tertie pt
et ppoerio est ppor. u. pcm ad q. ptes et superfluitas inter hos du-
os minos est e ptes et due ptes et due tertie ptis e. pcm due
sunt tertie qo si nos acceperimus ex u. ptibus et ex q. ptibus silem hu
parti pueniet nobis angulus g e b. tres ptes et tertia ptis et p-
ueniet angls n e b. p istas ptes 6. ptes et vnusquisque angulorum
duorum a e g. et b e d. reliquorum et sunt duo angli declinatoris orbis
egredientis centri sedm q sequitur est ps vna Et pueniet ex eo
arcus t b. et est arcus declinatoris orbis revolutoris due ptes et
quarta ptis qm hec est summa q comprehendit pcm fere in tabula di-
uersitatis hec sunt quantitates quas stuing angloru g e b. et d e b.
in saturno. et sone ppea. q nos inueniemus cursus eorum qui sunt in arcu-
bus longitudinis ppinquorum duorum orbium eorum egredientium cen-
terum no diuisificari in sensu a cursibus eorum qui sunt in arcubus lon-
gitudinis ppinquorum ipsorum orbium condrancibus illis cursibus.
inuenimus quod intendimus de re eorum sedm rimiqueqr modorum
duorum pp q ppaterq inter duos cursus eorum in longitudine longitudine
bum revolutoris eorum et inter duos cursus eorum in longitudine
appinquore eorum et fuit summa longitudinis sedm q scimus
ipam ex considerationibus particularibus eorum in cursibus quidem qui
sunt in appiione et in occultatione plenum quod est ad septentri-
onem et midiem et in saturno eodem due ptes fere Et in sone
ps vna et in cursibus qui sunt in habitudinibus extremitatis noc-
tis in saturno eodem usqz ad tres ptes et in sone usqz ad duas
ptes ppterea qd iam aput pp diuisitate que e eorum in cursibus
q q angulorum quibus aput visu subtenduntur in longitudine longitudine
et longitudine ppinquore orbis revolutoris arcus eqles quantitatis
pueniunt a cursibus in longitudine longiore ppor. ad angulos qui
pueniunt a cursibus in longitudine ppinquiore in saturnii eodem stel-
la est ppor. 18 pcm ad 22 ptes Et in stella solis e ppor. 29 pcm