Quelle: https://manuscripta.at/?ID=40656
Copyright: Melk, Benediktinerstift



74

transeunt in regionem ipsa. Et tunc non potest esse fortior vel aequalis ventus eum et ipse pellens non est ita fortis nec minus distat a pellente est ita fortis sicut medium esset quod patet quia quando ventus est ipse pellens tunc non est minus aequalis ubi potest dividere medium in medium aut distantia sit plures aequales quia possit bene dividere medium quia tunc circulus aequalis a regionibus per quas flat ventus qui tunc appropinquat cum vento et tunc ventus augmentatur sicut fluvius a quia fluit alia fluvia in ma et tunc hoc est non est defectus aequalitatis tunc ipse in medio distat a pellente propter quod deficit motus motus nec magis illa venti et cessat flare. Et est tunc dubium quae sit causa propter minus ventorum in ea parte hoc quod adeo flat ibi boreas aut auster zephyrus vent ea non potest esse sol quia cottidie sol facit unam revolutionem nec motus nec mania. Unde quia oportet reduci ad duas stellas ut oriens et occidens et quatuor stellarum et appetit stellarum fixarum ut si stellarum magis frigida dicitur in oriente tunc ibi ibant pellitur venti versus occidens qui dicuntur orientales zephyrus. Et sit propter hoc quia plures flant ventos borealis et australis quia occidentales. Tunc quia stellarum bene ordinatur fiant duae de oriente ad occidentem et cursus quia a austro ad aquilonem quia cursus quia quae volunt de oriente in occidentem per totam terram.

Utrum boreas qui vocatur aquilonaris debeat esse frigidus. Ad primo quia in ista quaestione determinat de ipsis ventorum et quia alii sunt quatuor ventorum et ipse est hinc potest ipsorum primum versus ad polum et hinc ipsorum versus ad diversas plagas tres