Quelle: https://manuscripta.at/?ID=40656
Copyright: Melk, Benediktinerstift



87

Secunda multiplicatio radius. Et no. q radius dr multiplicatur qd de colorato ut lucido radius madit in visu. Et linea recta. Dr aut madit fracte sive reflecte qd madit in oculu p lineas angulos ut angulos cau santes in medio. 2o fit duobus modis. Qz quiz radius madens de octo ad spectrum pt densitate speculi no potius pbipitur rucrta. ad pte ipsius octi. 2o vo inflecio et si ille radius pendicula. cadet sup speculu tu reflecta in se. qz no cedit no qz potius inflecta. vsus vnu latus q vsus aliud. Qd aut ille radius no directe cadit sup spectrum denuo re reflecta ad latus sic q angulq maddac et reflecti sint equales. Vocatur aut angulus madendi iste qui puenit qo radius madens sup spectrum. et sup ipsius speculi stat. Et angulq. a. c. d. Angulq aut reflecti iste angulus latus qo radio madente a speculo ad ipsum octum et qo sic ipsius specti. p. b. c. e. pz. d figura in qon. Vocat aut refractio qd radius madens sup spectrum madit vltra d spectrum. Et no indirecte. ymo madens ad vna pte. ut alia qstituit angulum in superficie speculi. Qd no q oculq videt octum p lineam reflecta ut refracta no indicat octum ibi esse vbi. Et indicat ipsum esse in isto puncto ad qd hec reflecta ut refractionis ad octum terminata attingere si pthet. in non vlt sup eum spectrum. Et qo illo sequitur causa qre fundus pelvis oz alter qd aqua. Et in pelvi q qd no. Et in pelvi qz qo quo in refractione res oz ibi vbi linea pedes de oculo ad octum attingit si the linea in directum pthet. qz notum. Et q the

qd radius dr multiplicat

qd radius diat. fracte intra

qt angulus madendi

qt angulus reflexus

qt refracto