Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8142
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

tica pedis si apostema fuerit in iguine
et in manu si apostema sit sub assellis.
aut tirca ptes colli. Et ex eadem parte.
ut materia venenosa trahatur ad ex-
trorpus, quia melius e notere mebris
exterioribus quam ut venenum remane
ret ad intra corpus et vadat ad cor-
et p hunc modum. phibetur. Et vltra
hoc uel ante vl' post sunt aliqui qui
dant 2 5 succi foliorum calendule, et e
vna herba que facit flores suos calos
quasi cum mense, et pter hoc vocatur
calendula ab aliquibus, sed hic vocat
flores mesium. v. all moneyt plüet Illa
herba ego laudo ꝛc Sunt aliqui qui
dant succum foliorum verbene cum cura. Noto
p quilibz succus herbarum semp facit vo
mere aut assellare, et dat ad bibendum.

Cap xvj.m Ad sciendum que sit differentia intra antrace et carbunculum, et de eis generatione et augmento et causa ante

Offert antrax a carbunculo cedenti.
nam antrax ut alias sup e decla=
ratum, est quoddam apostema venenosum
qd orit in locis emunctorialibz, et e reductum
p resudatione parcium subtilium actutarum
venenosarum, q ab intra uel ad extra poro

149

157