Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8221
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Si ergo pro singulis gradib. sumis 4 minuta temporis

	g.	m.
Vienne:	30	30
Longit.		
Tubing:	26	23.

differentia longitudinis e 4 graduum 57 minutorum. multiplico ergo 4 gr per 4 minuta, puenient 16 minuta temporis, reliqua vero septe minuta g̃dib. adhgrentia relinquo, qa modo dimidiu temporis constituunt.

Secundo Tempus quod puenit adde tuo tempori Astronomico ppositi dicti, Si locus tuus ad que erigis figuram cœli fuerit occidentalior, q̃ is locus ad que Ephemerides calculate sunt. Si vero tuus locus fuerit orientalior altero, subtrahe. Locus aut q maiorem habet longitudinem est orientalior. Ut tempus differentie longitudinis sunt 16 minuta, q subtracta ab 18 horis & 30 minutis temporis ppositi & Astronomici puenient.

hore	m.	
18.	14	tempus reductu & pparatu.

II de æquando tempore

Tempus ad pparatu ctiam æquandu est hoc modo: Cum loco solis inuenere tabula æquationis dicte, q est in Ephemeridib. fol. 53. ibiq in prima columna versus sinistram gre gradus loci solis qb. respondet minuta & secunda in eade linea transversali sub signo solis inuenta, secunda neglige, sed minuta ex illa tabula excerpta, subtrahe a tempore ppositi & pparato, habebisq