Bayern/Salzburg, Mitte 16. Jh.

Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8221
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Sicut ors tabulae, ita etiam Ephemerides ad certum aliquem meridianum sunt computatae. Unde facile potest intelligi eas illis tm gerere locis, q sub eo meridiano sunt sita. Ut autem ephemerides ad alias regiones sine errore accomodari possint, necesse est ut tempus tuum p differentiam meridianorum corrigas.

Cum motus ingrendi sunt, sic egere.

I. Quere longitudinem utriusq loci & tui & Ephemeridum, vel ex Cosmographia Ptolomei, vel ex Apiani Cosmographia. Minorem a maiori auferes, residuum de differentia longitudinis, eam in partes temporis gerersam (sumendo s. p singulis gradib. differentiae 4 minuta horae & p singulis 15 minutis differentiae 4 secunda horae: unum minutum temporis) adde ad tempus tuum astronomicum. Si locus tuus e occidentalior, loco Ephemeridum. Aut subtrahe, si est orientalior. Est autem is locus orientalior cg longitudo maior est. Occidentalior cuius longitudo minor est, qa longitudo ab occidente numeratur.

Ephemerides autem usq ad annum 1551 sunt computatae ad Tubingensem meridianum, cg longitudo est 26 q 23 m. Reliquae quinq sunt gpositae ad Venetum meridianum, cg longitudo est 32 Gra. 30 m.

II. Reducturus ergo loca planetarum ad meridianum Viterbiensem, auferes minorem longitudinem a maiori, & habebis diriam longitudinis duorum locorum, q gerentes in tempus, modo supra tradito.

Vitrb.	30 q	30 ′
Tub.	26	23.
	4	7