Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8221
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



Sicut ors tabulæ, ita etiã Ephemerides ad certũ aliquũ meridianũ sũt cõputatæ. Unde facile ꝓt intelligi eas illis tm̃ gũrnire locis, q̃ sub eo meridiano sunt sita. Ut aũt ephemerides ad alias regiones sine errore accomodari possint, necesse est ut tempꝰ tuũ ꝑ differentiam meridianoꝝ corrigas.

Cum motus ingrendi sunt, sic opare.

I. Quære longitudinẽ utriusq; loci & tui & Ephe. meridiũ, uel ex Geographia Ptolemæi, uel ex Apiani Cosmographia. Minorẽ à maiori aufer, residuũ ꝺt̃ differentiæ longitudinis, eã in partes temporis gũrsam (Sũmtudo s. ꝑ singulis gradib. differentiæ 4 minuta horæ & ꝑ singulis 15 minutis differentiæ 4 secunda horæ i. ínũ minutũm temporis) adde ad tempus tuũ Astronomicũ. si locus tuus ẽ occidentalior, loco Ephemeridũ. Aut subtrahe, si est orientalior. Est aũt is locus orientalior cꝰ longitudo maior est. occidentalior cuius longitudo minor est, qa longitudo ab occidente nũmeratur.

Ephemerides aũt usq; ad annũ 1551 sunt cõputatæ ad Tubingensem meridianũ, cꝰ longitudo est 26 g 23 m. Reliquæ quinq; sunt ꝓpositæ ad Venetũ meridianũ, cꝰ longitudo est 32 Gra. 30 m.

II. Reducũtur ergo loca Planetarũ ad meridianũ Virtbergensem, aufer minorẽ longitudinẽ à maiori, & habebis diriam longitudinis duoꝝ locorũ, q̃ gũrtes in tempus, modo supra tradito.

Virt.	30 g	30 ′
Tub.	26	23.
	4	7