Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8162
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

laudabilior est assata. Siccitas carnis melior est elixa. Similiter si
comparet vaccina assata et porcina elixa, incipiet veruges equaliter
pessima. Et vaccina cyrinna siccitate sua ad assandum illaudabilis,
porcina vero humiditate sua illaudabilis fuit elixa. Inde Galienus carnes
aliarum alterius elixe et alterius asse non fuit comparande. Sicut in crassorum
aliorum comparande erunt. Nam enim hec expectat ratio, nil erit quaeo. Duorum enim
animalium diversorum non carnes comparande sunt, nisi eiusdem sint qualitates, mutici
et consimilis, et eiusdem qualitatis certificat. Obiugum. Et quaeret porcina
et carnis tempat siccitas. Humiditas vero porcina nil porcina in crassitate
mutat et consistentia. Unde fit illaudabilis. Similiter si porcina et carnis
operent assata, porcina est melior. Quia humidus desiccat sua
siccitas vero augmentat carnis. Item vero faciendi est operaeo, elixa est melior.
In porcina elixa et assa operent, assata elixa melior est. Et

De diversitatibus membrorum animalium et in bono vel malo pertinentibus eorum et

Animalium membra tripliciter sunt divisa. Primum ex compositione sua. Secundum
ex loco. Tertium ex quiete et motu suo. Ex compositione vero est triplex.
Alia dura et nervosa, sicut cutis, venter, mesentium, nervi, arteriae, ligamenta
et similia. Alia mollia et tenera, sicut pinguedo, medulla, cerebrum,
mucha et silia. Alia media, sicut caro musculorum et lac eorum et carnes
certe pinguedine mide, maxime si de animalibus sint in crassitie temperatis.
Et hec membrorum sicca sunt et nervosa, frigiditas sibi dominatur et siccitas. Inde
ad digendum diu et stomachum laborosa. Insuper sanguinem diu et tarde nutribilia.
Nihil enim valent sicca, parum sanguinis et humiditatis habent, diu stomachum inmorantur,
ubi tarde coquuntur, et ideo ad mutandum prius, maxime si de malo sicco
veteribus sit animalibus, sicut bovinis et caprinis. Et sicut de inmorbis prius
crassis et valent humidis, sicut porcinis et pecorinis, si bene sint digerita
melius dant nutrimentum. Ad dissolvendum de membris duris et siccitas optimis aliorum
aliorum membrorum humiditate et crassitie temperat. Et hec membrorum mollia
et tenera sunt, calor et humiditas eis dominantur. Humiditas tamen plus in tria
dividit. Alia enim liquida, sicut pinguedo intra carnis admixta, quae est
mucuosa. Alia coagulata, sicut pinguedo circa renum, dorsorum locorum
firmorum et similium. Alia media, sicut cerebrum, medulla, mucha liquida,
et liquiditate sua mutare se, nec subtilis et consumi, significant. Coagulata
et coagulatione et consistentia, crassum mutantur sunt esse monstrant. Inde Galienus