Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8165
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Nachdem Elevatio ~~poli~~ Æquinoctialis, die höhe Höhe
mag 90 gr: ab so bleibt die elevatio poli, das diese beide
Diameter des poli und Æquinoctialis macht alweg ein rechten
winkel, als hie zu wissen hat die elevatio æquinoctialis
42 grad, derwegen muss die elevatio poli 48 gr: sein,
das 42. gradus und 48. sind 90 gr: oder wie man
den meridian gegen dem mittag mit dem Æquinoctial
zirkel, so vil gradt als man hat die elevation æquinoctialis
gefunden hatt, überzig bis der horizont zirkel so vil gr:
abschneidt, so sindt man alsbalt gegen über gegen mittnacht
die Elevationem poli.

Das 6. Cap:

Noch auf ein andere weis die elevatio poli
zu finden, auss einer jeden tag ein zu mittagig
Sonnen Höhe.

Man muss zuvor den gradt und zeichen darin die Sonne ist
haben, demnach rechnen man durch einen Quadranten die höhe
der Sonne im mittag, diese erfundene zahl nemmen man, darnach
nimbt man den Sonnen gradt und den meridian, und sehen man
wie vil grad der Zodiac und Æquinoctial von einand sind