Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8165
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



De descriptione et impositione stellarum

Das 13 Cap:

Die stellas findt man folgen. Die erste lehr:

Was man in d rete mit gar viel stern setzen, und nur die hellen und liechten, damit nit die villa der stern die circulos matris, oder die tafel astrolabij verdrucken, die vorab auf. 2. weeg ringelegt; die erst weis ist die gwisseste, und die liechteste, das man nemblich die stern solt anlegen durch rectascension ihrer declinationis ~~tor~~ ab orbe recto, d ist vom aequatore: und man muss 4. ding erkennen als longitudine, et declinatione stellae, partem declinationis, et eius magnitudine. Longitudine stellae determinat gradus Zodiaci, mit welchen grad ein stern kombt ad medium caeli, d ist, in mittags linien gehet, welche longitudo caeli mediatio genent wirdt, Declinatio stellae ist die stellae, d ist, die weite des stern vom aequatore, Pars declinationis ist wan ein stern ist in dem parte septentrionis od meridiei vom aequatore und die da gehn gegen dem polo antarctico od septentrione so wirdt ob pars declinationis septentrionalis, ad aquilonem genent, und was sie gehn gegen mittag ad polum antarcticum, wirdt ob declinatio meridiana ad austrum genent, Magnitudo stellae ist die grösse des stern des glanz und schein nach, und findt 6. grösse, deren die da grösten glanz haben, heissen die stern 1 erste grösse, alsdann die kleinern, 2 and grösse, die dritte, bis 3. grösse.