Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8165
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Die andere lehre stellas fixas nachzusetzen,
Das 24. Cap:

Dise weis die stern ein zuhalten gebietet: durch p notitia earum
ab orbe signorum. und mag nur auch .4. ding in acht nemen: als
longitudine, latitudine, latitudinis parte, et magnitudine stellae
Longitudo stellae ist die distantia ab vernio dessen principio .V.
arietis secundum signorum successione computando, und wirdt gemacht
durch den zirkel welcher geht durch die polos zodiaci, und certa
stella: Der ander zirkel also gelegen haist as die gr: und m: des
sterns in zodiaco. pars latitudinis ist ob er ex parte septentrionis
aut meridiei ab ecclipticae ist latitudo wirdt von d linea ecliptica
ca gezehlt: Dise stern ein zusetzen, dem thue mag also:
Mag zehlen in aequatore maxima solis declinatione vom K. gegen
dem .L. und ist .q. Zelle sie auch in aequatore vom .m. geg .n.
Das ist die declinatione solis und ist .r. darnach suche den polum
zodiaci, wie im .11. Cap: gelert worden, und ist .p. polus zodiaci
Darnach besiehe wie viel gr: und m: die fürgenommen stern in longi-
tudine sey, durch dises grads, und seiner gegen grads, und .p. polum zodia
ci mach einen arcum circuli occulta, welcher arcus ist mit s. p. t.
bezeichnet, am welchen der stern ist, Darnach besiehe sein latitudi-
ne, welche was die septentrionalis Zelle sie in aequatore a duobus
terminis declinationis q. et r. gegen n. functe orientis