Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8165
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Dyse elevation Zeller in dem quarta occidentalis altitudine
vom b. gegen dem a. und merckhs, darnach schlag die regul ab
auß dem centro e in dyses gemerckh, und wo die regul dy arcus
horae sextae inaequalis abschneidt, machs ein stuncken, o. darnach
mach ein kreisl bogen vom, o, bis in die linie e.b. auß dem
centro.e. dyses arcus ist der anfang Krebsh, darnach nimb
wid? nach auß d. tafel elevatione meridiana arietis et libra, als 41 gr.
20 m: dyse Zeller in dem limbo quadrantis, und schlag die regul
ab auß dem centro e in dyse elevation, und merckhs wo die
regul dy vorgemelten arcus horae sextae durch schneidt. p.
nach wird nimb ein kreisl bogen vom. p. in dy semidiametrum. b.e.
dyses bogen ist d anfang arietis et libra, also gehe mit dem arcus
capricorni umb, und Zeller sein elevation 15 gr: 50 m: und machs
also wie vorgemelt, also mues du die andern kreisl ein
schreiben, und alle zeit merckh wo die regul dy arcus horae sextae durchschneidt
wie nach gelerat worden. haec de fabrica tabiae

Die gleich stunden zu richten,

Arcus horae sextae inaequalis ist der bogen der. 12. stundt aequalis
für die andern arcus besuche die tafel: als erstlich umb 1 Ihr. N. ad
und. 11. N: suche die elevatione des kreisl anfang 62 gr: 19 m:
dyse Zeller vom b. gegen dem a. auß dem centro e in dyse gestunck
gr: setze die regul ab, merckh wo die in arcus cancri wo die regul
dy arcus cancri durchschneidt, also gehe mit dy andern stundt