Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8165
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

und suche die declinationem cancri (wie in d tafel gesetzt)
und .2. Uhr N. ad. 10. V. und merck allzeit wo die regul
der arcus cancri durchschneidt. und also fort mit allen stünden.
Darnach such in der tafel declinationes Capricorni vom 6. gegen
dem .a. schlag die regul an auf dem centro e in der declination
und merck mit einem stuch, wo die regul der arcus capricorni
berührt. Darnach suche das centrum respondens notis horae
primae in arcubus cancri et Capricorni, und mach ein zirckel
rings von disen 2. notis, es also dieser arcus des zirckels gehe
durch der bogen arietis et libra, darnach such wider und
das centrum respondens notis horae secundae, et intersectioni
arcus arietis cum linea horae .4. et 8. inaequalis, und reis
wider mit einem bogen für die .2. N. und 10. stund V.
also gehe mit der andern stunden und.
Dis ist zu merken es die bogen nicht allzeit durch durch der
arcus arietis et libra gehen, wo die ungleich stund disen bogen
arietis durchschneiden, es mag also das centrum suchen der
gemerckten punckten cancri, und capricorni ~~in~~ und der punckten
welche ungleich stunden in arcu arietis durchschneiden
Berichte nachfolgende figur.
Die centra der gleich stunden kommen in dem diametro
a c nit gesuecht werden, darum muss man es centrum such
zu d declination cancri, capricorni, und equinoctialis, es disen 3.
centra in einem zirckel verfertigen.