manuscript

Seite 17r

Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8296
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



ptem costae et sup sternum tendit sicut in ea basilica
eq ptis in qua est dolor nisi totum corpus nisi sanguis repletum
fuit tunc enim ex latere sinistro sanguis detrahendus est et sic iudicandum
est si iam per aliquot dies a sui principio in vestanum egre pleuritis
a parte dolente fuerit. Quod si dolor in sericis ad partem
costarum tendit venit ex decoctione cum in calore de resinosis
de superfluis et fluendis alienis tunc ut pleuritis fiat demandatur
ei zizanium assidue exhibeat. Et si videre tussim eius
vehemens sentiat de eis in diluculo id est die iulii. Deinde de
eis si potu aquae ordei. Et si ego sicut debilis invitat cum
pane et zizanium. Si autem fortis fuit aqua ordei usque ad septimam
diem sufficiat. Cuius pituita in aspiret de corpore quia in calore
de resinosis noxiamque totius sicut antiquum ordei sicut dimet
sinat. Si autem febris et acuitas per sentit et ego difficultatis
in ex stercore patiatur det de corpore quin in calore de asmatis
noxiamque. Quod summe faciendum est si fuerit ex stercore. Si
si in principio pressione ego extrahit magis in dubium valde ap
paret et pit per manibus et non quiescit se. neque valor usque
ad diem septimum tumoris. Et si id ex toto aer attractus
non allenietur et si praeter sicut originem a maxillis ruit et
sicut labor et mortis imminens. Eo autem ex in latere apparuerit
rubedo a pasteanis et cum primum locum dolet pona de super
vetosa aut emplin ex sinapi et fenum et dilata ubi dolor
locus ulceretur. De hinc non ego ex cerne proludere ad augmentum
nocumentum amidum hac egritudines praeceduntur et ego dolor sentiat
In principio sub costis efficiant fore ipsa ventositate quod ego eletin
dyamq a eius filia ego tribuit. Cuius non metuit hic qui
evitabit bresen cuius causa et apis quod erit in sericis in costis
ypocondriis. Quae non in tempore erit evitat bresen. Si senes
cum homines superiorem se et in anhelitu De Peripleumonia
tantum pati ostendunt ut se proferat
putet et in maxillis ita vehementis sit rubedo ut tute vide
antur. Et anterior pars pectoris dolet et tussis ad est. Et