Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



xxxij.

Unde dicit² umbilicus

hūditate multa remolliente
ligameta umbilici 2 subam
eius. Cum enim umbilicus
debet esse sic umbo sustetans
intestina omnia et sustetata
tonsionis. Quemulte hūdita
tes mollificet villos et li
gameta eius, ppter quod op
tebit eū ex primere. Et
cognoscit primo ppter sūdi
tatem in corde repressionata.
2° p mollitie multa tio
ppter sensatos motus nodosi
sub digitis tangentis. 2° to
ppter residencia alicuius
fouee in pte compressa a di
gito. 4to ppter hg. dispo si
tionis fixione. Cum locus
no absoluat a psentia hu
miditatis tumefacientis.
Et canon curationis talis
eminentie e cū digone et
equatiuaroe diuersionibz et
consumptionibz aquositatis
illius, et rectificatione epa
tis et stomachi, phibetibz
talis aque regeneratioez.
Et tu lege de eis. xm. 3.
ta°. de curaroe asclitis.

Unde dicit² umbilicus

Quid cognoscit² umbilicalis hernia.

2. spes eminente umbilical ep vetosi.

Ordo do spes eminentie um
bilici e multi do vetositatū
que congregatur in sup
ficiem conexam intestinoe
et concauā ipsig umbilici. q
ibi debet multiplicate in
merseg et coartate in par
tibus integratibus ipm
umbilicū pellere ad extra.
Et a gbusda nōiatur tim
panites umbilicalis. Sic
predens ab eis nōiat asclī
tes umbilicalis, cuig signa

sunt facilis et festina euento
eius ppter facilitate molli
tatis vetositatis. Cuius op
positū adulenit i eminentia
aquosa ppter pigreū motum
aquositatis magis qm ven
tositatis. Ordo signū speciale
huius e somnig et gurgula
tio preptā in ptibz umbilica
libis. Terciuz signū est fa
cilis fuga ventositate a co
primete. Ertū signū e no
ming facilis vetositatis re
ditus ad locū vnde pulsa
fuit. Quintū signū e resiste
tia debilior tangeti in hac
dispone quia in predente.
Sextū signū est absentia
remanete fouee. Septimū
signū est aliqlis caliditate
vestigiū in parte tumete
preptū, et hec ōdem dispo
sicionis cura debz esse. ex
determinatis in xm. 3.ii ta°
de cura timpanitis. Et vo
terria spes eminentie umbili
calis accidit pti ruptura
ligametalium pe terminū
umbilici. Cū enim cordose p.
2.or musculoe teasue saliuad
et alioe villose ptes disrup
te sunt dilatant mino um
bilicū. in cuig dilataroe re
cipiūt sifac zibus et intes
tina. Et cognoscitur primo
p dolore euenente repere
eruptionis ipsius, et nisi sp
in separabile. 2° p tensionez
et diuisione in ptibz preptaz.
3° p augmentū eius ex re
tentione anhelitu ad quā

3. spes eminentie