Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

CC lxxxviij.

congregata ut patuit i ca-
pitedenti dissoluta et tolligta
aut mobilitata a rebg tali-
dis in cibis acceptis et i po-
tibus faciunt materias istas
effundi ad epar in tuig con-
tranitate pter angustias vi
arū eius faciunt opilationes
pdictas Et 2o istarū opilati-
onū causa pt esse, qp matie
iste flegtice commscetur chylo.
reddentes ipm fridū grossum
et vistosum opilativū ipsig
epatis. Digestio enī dim-
nuta ipsius stomachi raro, et
nō bene corrigit a digone
epatis vt colligendū e xm
tertij Cp quo apparet soluto
pluriū que in eo apparent,
freqnter em in ypocundrio
dextro sentit grauitas et
tensio, frequēter etiā in eo
apparet notabilē diminu-
cois in vrina Et hoc e qn
opilatio cadit i cōcauo epate
Cum enī cōcauū epatis opi-
latur nullo claudit vie ve-
narū portarū, sed ipsis clau-
sis non pt retrpi chylus in
epate Cum ergo pellitur et
deferitur chylus a meseraice
ad epar necesse est ipm re-
tropelli ad intestina. Et ob
hoc accidit fluxus chilosus
Fit fit accidēria gma ad
opilationes que iterū si p
durat, vel i cōcauo vel in
gibbo epatis necesse e. ut
finaliter pducat ad febres
putridas, pter opilationes
em retinent in epate mē-
que deberet expelli p gibbū
ad emulgentes et ad renes
que etiā materie deberet
retrpi in cisti fellis Sed ad
retentionē talium materiārū
phibet debita eiectatio ad-
phibitionē eiectationis inte-
ditur caliditas in epate z
ad intensiuā caliditate ipsi o
sequit aut simplex ebulli-
tio in sangine, et fit sinocha
sine putredine cū effusio-
ne ad ipm cor. aut fieret
ebulitio cū putrefactione cor-
dis effumate, et erit tunc
putrida febris, Cp quibus
omnibus iste viz intelligē
potest quare ipse freqnter
egrotat febre colerica pura
et impura z aliaq speciē
Tertia dispositio hui
viri est lapsus renū ad ca-
lidū et siccū, cū quo lapsu
freqnter cōplicātur opilati-
ones et dolores i eis, et
iste opilationes plurimū
fiūt a mā flegtica desten-
dente ad nerūos a stomacho ut
ab epate q faciūt opilatio-
nes nō solū in pāniculo co
latorij renū sed etiā in tra
nositate eorū et cognoscit
hoc p dolore infra ypocon
driū parūp percepti, et
cōtinuata in pte posteriori spi
ne infra costas. Iterū qnqp
in rembo fiūt opilationes
a multitudie arenularū in
uistatarū an pāniculū co
latoriū a flegtica mā, de
sursū destendēte, et appa
rent tūc vrine valde tenu
es. cum bibis pettalaydibus
et arenibo priuate, et di
minuit etiā vrina z qn qp
aruta emittit Et apet ho
etiā a posteriori 2o sumedente
vrina grossa et arenosa p
tenue et aquosa alleuiat
dolores qui prius erāt Et
adde pditis cp isti dolores

nō de dolore renū ꝛc.

nō i rogo.