Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8258
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

duplex ẽ vas spermaticũ
scz dextrũ et sinistrũ

dextrũ et sinistrũ / Dextrũ vo
vas oritur ab emulgēti vena
et descendit inferius usq ad
orẽu velatũ extremis inferio-
ribus sifach / quorũ velamẽ-
tũ a sapientibꝫ didimus no-
minatũ ẽ. Et hoc quidẽ sper-
maticũ vas a sapientibꝫ po-
situ ẽ deferre mãm genera-
tionis spermatis scz sanguis
iam depurati in vena chili.
et alijs venis ramificatis ab
ea. quarũ concauitate cōtinu-
atione earũ adiuuãte sanguis
ille delegatur. ad emulgẽte
venã. Cum ergo ab illa oriat
vas spermaticũ sẽ. ꝙ cōueni-
enter deferre pt mãm talem
que prius recipit. ĩ inuolutis
vasis in oreo inuẽtis / quibꝫ
Aristotiles posuit talem mãm
in sperma cōuerti licet ypocꝰ
et Galienus et collegẽ ipor
posuerũt sperma illud vltiaz
sua pfectionẽ acquirẽ in tes-
ticulis vts. Secũdũ sperma-
ticũ vas ẽ sinistrũ qd orit
a ramo arterie adorthi des-
cēdẽtis Et hoc quidẽ tale a
sapientibꝫ ponit ad mẽbra
generatiõis deferre obiectũ
quod tenet locũ formalitatis
magis et ẽ spũs vitalis / ex
cuiꝫ tēpamento ĩ mẽbris coy-
tus et generatiõis defertur
virtus formalitatis spermatis
ĩ mẽbra gnationis spermatẽ
Utrũ autẽ p hoc vas sperma-
ticũ ad membra generationis
deferat ꝑcise spũs vitalis a
simul cũ ipso sanguine arteri-
ali est questio quã pauci sa-
pientũ aggressi sunt et raro
de ea inuenit bene determina-
tũ Credo tamẽ ego ꝙ sic per
dextrũ vas spermaticũ defert

sanguis et spũs nãlis ad
mẽbra generatiõis Ita per
vas sinistrũ spermaticũ de-
fertur spũs vitalis ꝛ sanguis
arterialis / Dico 2º non esse
necessariũ sanguinẽ arterialẽ
ad mẽbra esse delatũ / vta ma-
terialiter transmutari ĩ sper-
ma sic sanguis venalis trãs-
mutat. in ipm qm trãsfert
in vas dextrũ / licet etiã pro-
babiliꝰ teneri posset hoc scz
ꝙ sanguis arterialis posset
esse mã spermatis In suma
ergo ex hoc fundamẽto pulchre
intelligi pt quo ex distẽpie
vasorũ spermaticorũ accidat
nocumẽtũ ex coytu ꝛ gene-
ratione. Sexta causa pn-
cipalis nocumẽti coytus as-
signabit ex pte nocumẽti
inuenti ĩ membris vicinis
mẽbris coitus Mẽbra autẽ
talia plura spẽ distincta in-
telligi possunt / quorũ pmũ
sunt spondiles caude Scdm
ẽ siferi uel circulus ani 3m
ẽ muscilosa uel carnosa pẽs
siferi circũapposita Quartũ
sunt vene emorroydales in
extremitate intestini recti
inbibite Quĩtũ ẽ attritio co-
quassatio uel dislocatio ĩ spo-
dilibus pdictis magnũ inde
nocumẽtũ inuehe gmitari pt
et ꝯsequẽter coytu eo qr a
spondilibus alkathim et
caude spm aĩalem et sensi-
bilem portãtes ad pdictas p-
tes. Et mẽbra generationis
vt pt colligi pma pmi sũma
ꝯca finali ca.º Adhuc etiã si
contingat apostema ĩ circulo
ani et emorroydalibus par-
tibus magnũ nocumẽtũ ex-
sistere pt in coytu pficiendo.