Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



.16.

Cap.m 16. de vulnē fēta cū cōfe
t sagitta t sēlb ī femore t īguine
t pēlb ādiacētibus t curatōe eius

Considerandum est ī mō vulnis
loci ipius. sīc fiat cū sagitta
sīc cū aliquo alio īstrumto

Obsuat q ēgulis mollificationis
loci sagitte t dilatationis vulnis ex
hatur. Et cū h si fuerit nātis flōmē
ul sanīfitē locus ī firmus. Et utā
sepe dusteri ul suppositorio ut ī lar
gitate ventris bn se hat ot die pz
quādtate assumptor t et ī plus
ut sp de superfluitate residui aliqd
expellatur Dieta ī firmi valde
sit ordinata tendes ad frigidtate
usq ad siccitatē ne ī loco vulnātō
possit apa gnāri Et potus sēper
q supius roc hori vel spem ī
firmitatis multor dīmduimus.
Quo pnē ī hor casu sit considera
da. vz utr uesica sit lesa an nō
Sēm utr sīfar substines intes
tina ne descendat ad bursam testicuor
sit lesa an non

Nam si virga ul bursa testiculorū
ul inguina. ī alia mbra ibi adia
centia fuerint vulnāta ora utr
vulnā fuerit ī indigentia q ductura
prius propt magnitudīem. ro dum
t procedas ut supius dīx est Sīl
conductura prius non ī diguerint
defende longe t mūdifica vulnus t
ī carna t finaliter consolida ī Si aut
uesica lesa t vulnāta fuerit q sies
p exitū urīe ex vulnē. dum ipsū
vulnus mortale Cuz uesica ꝓ ner
uositatez t residuas gtuiz residen
tiam urīne corodent subiz uesice
t addent ī dilatatione ulteris
seu vulnis consolidationem nō expect
pz quāuis h sit curabile nō est desperād
qn curabiliter ī eius prēdatur
curatōe Omn ingemo ī tendas
circa ī cicatrīcationem ulteris ut vul
neris uesice ab ipo principio Et cū
conformatōe loci ne apa gnē ī ipo
vulnē t sup ponatur hor ī carnāti
Et mellis ro. q s luc fimas drac.
aā z. j. pulverizent t misceat Con
formatiui q ponitur circa vulnus
fit ex bolo. t o. ros. t aliquātlo aceti
Et nullo aliquo tpre ī ipo vulnē
ī ī aliquod oleum ponā quia
de oleo vulnis grīs fit ī pedit
uesicē. ut cū ulcēta fuerit. q tūc
tpr ponā ne possit consolidari. Et
ex hac cā cuitatur oleum ot tpre
ī vulnē uesice. ī intercipiatur cū
pdicto t consolidetur si po fuerit
Si aut sīfar totīnes intestina vul
nerātur fuerit q sies p desesu
intestīī ī sermis. ī contare ipsū
zifar vulnerātus tangē t videre
t conductas ptes eius si po fuerit
cū satura t pone sup sutura pul
uēz cōsuatz t ī vulnē extorī ī
cicatrīcatiuiz dictuz supius. t nullo
pstimas ponē ī aliquo cātu. ī āq
tpre oleum. Et sic ī carna p ipsā
viā ipz vulnis t loci t nō alius t ī
fine cōsolida. Ep hat ī fīnī ī ipsī
casib uetre largius q valde utile
est, ī id q intendit medicus Et ab
stineat ī fīnī a potu posse ī vulnib
uesice spālis. Et sit eā potū stipticū