Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Capm 17 de uulnē ci ense ⁊ sagittes
m cucha l' sica ci exit. ⁊ mo cura. e

17. Cum contingerit loca scie uulnāri
non sint timorosa vulnā ms
propt magnitudinem mbr ⁊ nuositates
eusdem. ⁊ propter lesiones liganā
ex uuus lesione sequitur m fine ci
rationis claudicatio. Si aut sagitta
fuerens tubus m transierit os ci m
genu ⁊ subtili m uestigatione loci
aut oleo zoß cū ⁊ dilatatioe uulneris
pellis eas extrahe. Qua ex'cta in
pleas uulnus pma uisitatione cuz
vi. ouū. ⁊ olro. mixtū. Et ci loci pos
bolū ci o ro. ⁊ modico aceti ⁊ suco
solatri ul sp uue. 2a uisitatione pos
m uulnē ⁊ sup uulnus mundificatiuū
tale. ℞ mel ro. l. s. fa. se. fe. gr.
⁊ se. bm ay zo olei d cū fa. oz.
ay ʒ j mmisceantur. sl. hoc mu
dificatiū est ualde sedatiū dolorū
tota enz m tentio tua i uulnē ipsiū
loci sit m sedando dolorez. ⁊ i eu
trando spa. qz m eo no credit du
bui ms p ista duo. Dieta eius
ergo sit fra ipsū ad securitatez
ne apd gnē mloro ⁊ ut dolor
sedetur ne supuemat. Et pot sic
fiat ergo ex aqua d'ror. oz. ⁊ ra
d'ce petrosi. Si aut uulnus fuerit
loco isto ul ist ci ense ⁊ sublibus ita
q m digerēt conductura pars ci sutura
conducant. ⁊ procedatur ci alyg ut
supius mlioriens diximus. Colomia
uel sanificatio no obmittatur. ß
largitus uentr sit i eo ytē. ne lo
ay m stercetur exaff mtoe loci
retinentes fces. ⁊ hoc est bonu ⁊ uti
le m hoc casu. no ergo obliuiscaris q
bn erit tbi. Capm 18. de uulnere
m coxa ci ense ⁊ sliby ⁊ sagitta
⁊ mo exit. ⁊ curoi eius rct

18. Cum uulnātur coxa fit uulnus
timorosus propt latitudinem ul mus
culuz magnus illut existentem a
quo separantur corde uenētes ad
motiz cruris ⁊ ad compositionem
eius uenunt nuj a cerebro portātes
omez passiones dolorū m ducti a
uulnere loi ad cerebr. Ex qua copo
sitione dolorosa multot puent
spasmus ⁊ propt uenag ⁊ arteriag
magnas coxe. que ci m ridut
fluxus sanguis eazt. aut ci diffi
cultate constringitur. aut nullo mo
⁊ cuz non constringitur sequitur mors
ex necessitate. Fit aut uulnus m coxa
ß longu. ul ßm latuz. magnu aut pmu
strictuz ⁊ profundu. ul no profundiz
⁊ strictuz uel pmu. Si aut uulnus
fuerit magnuz ßm longuz. ul ßm la
tum ⁊ non fuerit profundu conducas
ptes distantes cuz sutura. Et pone
sup sutura pulueez consuditiuū suture
⁊ dimitte i loco declinozi aliq os uul
nerf aptū. p quod sanies mundificē
Et supra os uulnus pma die ⁊ m su
p sure oris. pone ug. ouū. mixtuz cuz
aliquantulo olei zosati ul cuz farina
ordei. ⁊ circa uulnus cotinue bolu
ar. et sanuz sp uue ul solatri mixta
ci oleo zo. ⁊ aliq'ntulo aceti. Post
pmas uisitationez uero ponas sup
os uulnerf ⁊ i supsine oris mudifi
catiuuz d melle zo. fenu ⁊ fa. oz. ul
auene. ul altiuz cū eius generf
Et ci uulnus mundificatuz fuerit
m carnetur ⁊ consolidetur. Si uo
ipm uulnus fuerit magnu ci ßm lo
guz. ul ßm latuz. ⁊ fuerit pfundu
considera nuu ul latuz sit fuerit
m risus. ßm totuz. ul ß ptem ⁊ qua
etiaz si uena ul arteria m risa sit.
ex qua minus fluxus sanguis seq
Si uero nuus i asus fuerit ßm totu
ul ßm ptem conducas ptes eius s
cure sueudo ipm nuiz m asum e
filo m terato sit. Qua ex hac co
ductura ptuz nuj m risi ßm pte
ul totuz. fit p suturaz ⁊ contributo
mbr. leuior ⁊ melior. ⁊ curatio
uulneris breuior ⁊ ci minor la
bore aput nāz. Et supra ipm n
ui conducas ptes uulneris. s. pelli
⁊ carnis adm uiez ci sutura. nisi
sanguis fluxus minuiz impediez
Si uo minus sanguis fluxus
impediret primo ⁊ i pma uisita
tione constringe ipm fluxu ci
rebus ⁊ modis dictis. ra. de vol
nere colli. Et sequenti die post co
strictionez reddeas scare ad su
turaz nuj m risi. ß ptez ul ß tot
⁊ ad suturaz carnis ⁊ pellis sup
suturaez nerui. quia hoc est bonu
⁊ no nocens. ß po aiq consideres
Si aut minus sanguis fluxus no
impediret. procede m sutura