Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

cadit signum est fractura vel sepa
rationis ligamenti ligamentis caput adiuto
ry cum pissida spatule. Et in hoc casu
dislocatio adiutory non recipit cu
rationem, nec dislocatio vertebry
exce. nisi mollificatio illius ligamenti
est ex materia humida. mollificante
loci q exstaurari posset bonificio cau
tery facti in loco. in tribus locis circa
vertebrum. Et si p ista via cum li
gatura dicta formatione non reci
piet i statu suo. non est spes abscida
amplius de cura eius. Omittere
ergo curam istam melius est. Quod
si os istud longo tpe steterit dislo
catum. et ita diuturnum recepit. mol
lificet locus cum unguento de quis
supius. et fomentet omni die bis vel
semel cum aqua d'oc. malvamisca
et seni. fe. g. et similibus. Facta mol
lificatione trahat et moueat locus
cum pilla et matili fortiter et reducat
ad locum et si p hac via non possit re
staurari ponat alicui rotundum cum qua
das latitudine i titulico et ponatur
aliquid lignum rotundum cuius longitu
do sit tanta. q duo homines possint
illud lignum super spatulas tenere
et super istud lignum ponatur pilla
que est in titulico loci i fiemi et sit
tertius qui teneat cubitum adiutory
versus firmum manibus et suspendat
p istum modum homo versus ad istud
lignum. vel suspendatur i firmus sic
istum modum ad lignum scale manual
et fecit id. Si p istam viam reduci
adiutorium bonum est. Si ito non
dimittatur quia in curabilis est
egritudo. Sic si p istam viam non re
ducetur. procedatur i cura eius
in omnibus ut supius dximus post
quam exstaurato debite facta fuit.

Capm 22. De dislocatione cubiti cum ulne.

22 24 Nobis est exstauratio et etiam
huius loci multum pp sine ulne
eius compositionem. nec ibi sunt
ossa multa et humida figuram to
tale auferendi aquam a puteis
qm alibi vel cum difficultate exstaurari
seu nullo. Cognoscitur ex tactu
cum in ventre eminentia in debito
in loco isto et exceo q i fiemus non
pot brachium mouere i loco ut consuet.
Dot pter fractura in hoc loco et alys
modis omnibus accidere torsio mol
lificatio vel separatio que via curari
tur eisdem rebus et eodem modo
ut dislocatio. p cum magno labore
exptes exstauratoris et magni dolo
re quo ad firmum. Sic medicta
flomma. ventosatione. et potu et
clistery et suppositorio non differt
pter q quia qm dislocatio est non
vulnere. liga dislocatio pse et dex
in 3m vel 4to. et vulnus poluitur
omni die et liga cum medicinis co
ventibus. Ecce ido torsio vel mol
lificatio seu separatio cum vulnere fiet
omni die et hora qua ligatur pol
uitur. mutatur vulnus. mutatur
torsio vel separatio seu mollificatio
Costa et inquisita dislocatione cu
biti. oportet vel restaurator capiat
brachium infirmi circa rasetum
cum manu dextera et cum manu
sua sinistra. regat et comprendat
acutatum cubiti. Hoc facto mo
ueat brachium q sic cum manu
dextera ant et retro extendendo
up in et plicando vel flectendo sua
uiter. et tam diu q locatio completa
sit. Et tunc in mediata ponat sup
locum lesum peciam infusam i oleo
rosa. tepido et bene expressam. Et sup
istam peciam ponat emplastrum
constrictiuum dictum supius. Et sup ep
ponat fildellas nimio plures. ut
totius locus comprendat undique et p
ligetur cubitus plicatus versus
pectus et suspendat cum plicatione
tali cum mantili ad collum. Deinde
ordinat flomme et manu gna vel
ventosetur i spatulis. Clisteri
zetur vel fiat suppositorium sim q
fuerit natum. Liga de 20 in 23
diem vel 30 in 31m ne in locus i dura
retur. Et omni die et hora quando
mutatur vel ligatur extendat
brachium et plicetur tam diu q
suauiter et p se possit up in infim
extendere et plicare. et sic fiat
usque ad finem. In fine ungatur loc