Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

no restringet nisi duobus modis a
forti ligamento / aut cum incisione
uene per medium separantur. qz si iuxta
per medium capita extrahuntur et a
carne q in circuitu corporis cohopiu
tur et desiccantur. plerq ergo in casu
ligentur hoc modo. Vena in asa ligetur
duobus locis dimisso in medio spatio /
deinde mittitur utraq ligatura in illo spatio
in adatur / hoc facto stude ut caro
gnetur angq ligatura soluat / nam
nisi acinus nasterna accelerata fuit
et locum fissum impleat / quodam uacuum
in eo medio remanebit / et fiet pa
sso q dr empoysma. Est autem epo
zysma tumor mollis tactuq cedens
sangine plenus / in du ligatur sangis
euacuatur / du solutum mox replet / pel
lende eum uenam pulsatilem durae sit
et difficiles ad sanandum / non enim tunicae
eas non posse sanari difficulter et tunicis
alys solidantur. Ego multos hortes
pulsus fissus sanaui non tunicis remanentibus
in eo passo q dr epysma. Pulsa
ntes enim uenas testatur galienus
se uidisse solidatas et carne et tha
eas solidatas ut gnatas ita q non
remanserit in eo spacium q dicitur epis
ma. in pueris et mulieribus in fronte
oculis planta et rasceta / ait enim
quidam Juuenem mittari mulnauit
pulsus et mox sanguis clarus lu
cidus rubeus calidus resiliens
in modum pulsus / cui mox pui me as
coglutinatum uisceras et opila
tuas tenes utraq labia fortiter
mulneris sic medicinas quoq mol
lis in posui spongia ligans ea et
sic per 3m diem dimisso post uno
quatuor diebus solui brachium et ve
nam quietam solidatam in uenis
uetzato me as in posui et deinde solo
mqd mulnus huiusmodi sanari
prospexitur. Et fac fabas et sim
de per medium et pone desuper venas
pulsatiuas et liga strcte usq ad
quatuor diem non remoueas

ligaturam. nisi carata remanat in oculis
alys in quibus uene pulsatiles fuisse
sunt / remanet passio q dr epysma
in quibusdam tunicis magis in alys pu
erat. Et stras q me na in ustata
melior est ea q cortices facit / opila
tua ud absq ulla molestia carcis
in mulne cresce cito facit. Increscua
uo dubia et ne corrumpatur caudetur quia
fluxus sanguis reuertatur. Inquit
galienus dr. q omnibus me nis lau
dabilior est illa qua epam in sanguine
a pellicula cerebri deffluxerit q est
fit tuzis albi uisteoxi grossi quod si
striga dentibus non rupitur si ponis
in uista et coglutinatur ut manx
pte. i. aloes. ÷ q pulueratam donat
ad spissitudinem mellis deuenant
cum oui albumen tempera et in leporis
pilis in ducta sup mulne in podat
et fit de me na quantitas satis mag
dem ligamentum. quae ut quiescat
sup loco mulneris involuatur et fit
uersus in eum uenae ducatur / nam ungz
pt pellicula cerebri / post in duci usus
uene in ciui post tres dies soluat
et si medicamen adhesit mulneri
nullatenus remouetur qn ymo
ligatura sup in ducta deinde eadem deinde sup
me na. Si uero medicamen 3o die
cecidit donec caro gnetur in mulne
deinde eodem medicamen humidiori in
aliquantulum suppone et mox talis
fiat ut in pipiori pte sup fissura
conspiratur ita tunc cuedo si ne dolor
gnetur. Nichil enim adeo fluxus
sanguis et apa prouocat sicut do
lor me na pducta. dus modo fia
Inqd. G. in corpibus ~~[illegible]~~ du
cuorum aloes pt. i. thuris duzisti
pone in mollibus uezo eguo / harum
tunc una uisteoxor est / altera stip
tratat plus habet / aliqn pono equalitate
de ambobus sicut expedire. Aliqn
pono cortices uitis tuzis / septicides
enim sicut thus in melius et in de soli
dando et in uistando / dicit enim