Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8335
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

q totu brachiu compendat. qm si solus
locus fractus suspendatur ⁊ partes
reliq negligantur mbr a fortuosita
te no curabuntur patientes. ¶ Et cus
todiat se in firmus ab oi motu am q
brachiuz fortifice. Et eius dozmitio
sit sup dorsu suu. ¶ Fractura hec i
vigmti octo dieb. uel treginta to
solidat uel circha hor. sm dispoiozz
complexioms ⁊ dispositioz urtute
Rubrica de fractura digitorum manus
Ossibus digitorz si fractura tm
gat sedeat in firmus sup sede
⁊ teneat manu sup plana tabulaz
⁊ extendat ossa fracta mnsi ⁊ medius
police ⁊ m dice eqt illos. ¶ Si fragā
pollex ligetur sic quemt ut dr est ⁊
postea ligetur cu uola sic cadat eius
opositio ⁊ figura. ¶ Si fragā index
aut auriculaziz ligē cu digito sibi
propinquo. ita qz quilz cu suo oparzi
uel quod melius est si m fmu nd q
uat ligetur digiti omis sil. ⁊ illud
tuza postqua cu pulullis astellis ⁊
ligamis mbz lesiz ligatuz fuerit
sm doctrina supra dictez i capto vi
sup eius pnotato. Et de fractura coxe
Coxa qm fragē no occultē sensiu
⁊ distenitur apte qm gutture
ad m trozz uel exteriozz partez. qm os
eius latuz est. Restituratio eius est
ut iaceat in firmus sup fracē sua
exten sup. dein extendā mbz ex
utraq parte cu ligamis aut alys
spebus extensioni a duob mstris
az fortitudine mlta si nāe fuerit
⁊ mediocris eqt fractular cu manibus
suis equatioē ultra. ¶ Et si m uenis
frustra ossu pugēcāsa. fac illud qd
mtoriez dixmus de reductioe i orp
ad loci sui aut de extractioe si illud
no fuit possibile dein ligetur ligatū
decenti. ¶ Et rgmie circoiz eius
sicut i cāo de fractura ossiuz i ulā ⁊ in
adutorio ⁊ ⁊ ostensiuz. ¶ Inqt Auct
ille cui coxa aut anchā fracta fu
erit paruz d nudat a claudicatione
Ita ea adibendu ⁊ sinnu studiuz et
mgoā i ef admstratioe ligamtoz
¶ Et fortasse qm fractura est ual
de magna sup ligamta ponitur
tribule ualde magē q capiat longi
tudinez pedis. Et m tentio illaruz
tabulaz ⁊ ut sana ps pedis pro
hibeatur amotu. qm est nocuus
⁊ prepue apud sompnuz. ¶ Et oz ut
aborcas illa trozz pdictoz i stroz
qm potueris in uenire aliuz modu
quietis. est em gue ⁊ m tollera
bile ualde in firmo. Et aliq me
dicoz post decretez illatioez mbzi
cu pulunaribus figimt pedes palu
uxta pedem in firmi i tra. ⁊ ad
palu ne aliquo mo mouz ualeat
fortiter ligamt pedem. ⁊ est modus
melior ⁊ cu miori gtiamie i fuz
Et m oib alys ad ulē cap rerum
Et dixerut sapientes huius artis
q coxa fracta i qmgqita noctib
solidat uel circha. Et de ac cao
Rotula poplitis. rotule genu
raro frangitur ⁊ sm plurim
q tenitur ⁊ cognoscitur ex tactu ⁊
aspitate ⁊ uanitate q sentitur at
tactu ⁊ auditur aure. Et in aura
eius oz ut extendā crus. d sm in
tromittā rotule in loci sui ⁊ ssi
pata fuerit agregē pnus dein
m tromittā postea ligā. De fract
tura ossis cruzis Rubrica n. 20
Ossa cruzis duo sunt. quoruz j. m
est magnu ⁊ nouatur crus
illud ē pnu ⁊ nouatur facile. Et qm
frangitur os pnu est saluu. q
si frangat magnu ⁊ eius restauratio
est facilior. ⁊ m clmato ē ad
itezioza ⁊ pot i fmus ambulare
Et qm sil ambo ossa frangitur fe
est detius ⁊ tunc quezitur triu
ad omez partez ⁊ hec ē res q no
occultatur tibi. ¶ Curatio ucro
fracture cruzis est sm sil ez fnc
ture brachij ex eo q spes fnctūz
stat sil anē ad m uice bez tam
albucasis addit opatione qnda
m cruze videlicet ut coponatur ta
bule due decent sm longitudiez
cruzis genu usq ad m feziur
pedis ⁊ ponā una ab una pte
pedis cruris ⁊ alia a altera.
dein ligentur m trib loc i duab
extremitatib. si ⁊ m medio. Et