Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8491
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek



De Mamillis

propinquiores connexo matricis sunt
gratiliores et profundiores cum et
matrix profunde situetur in corpore
scilicet inter longa ovem quod equitat et
vesicam que ipsam equitat. Per
has igitur venas rapitur sag-
menstruum a matrice ad mamillas
et equivocatio et cum penetrat in sub-
stantiam mamillarum que est caro
alba glandosa facta naturaliter
dividuntur in ramos plurimos vel
minimos ut singulum sanguinis contingat
a singulo carnis albe ut melius
ibi dealbetur et elaboretur. sicut ecce
accidit in distributione chyli per sub-
stantiam epatis. Ex quibus scire po-
tes causa primo quare mulier habens
mamillas plurima caret lacte in ma-
millis et equivocatio non sit robusta
carnosa valde. Secundo quare mamillas restri-
guntur per siciam i. ventosam
in radice mamillarum positam
et lac diminuitur per ventosam in
summe ventris applicatam. Tertio
quare lac generatur in mamil-
lis post vii vel viii menses impregna-
tionis quia tunc vetus completus
est et nutrimento menstruo plu-
rimo amplius non indiget quare re-
gimine nature sursum mittitur ut
lac generatur pro fetus educatione
post partum et si lac generetur in
mamillis virginum est ex necessi-
tate mere non ratione finis et si ecce
generetur in mamillis virorum
non fit per delegationem sanguinis
per venas predictas cum in ipsas

non habeat sed per venas nutrientes
mamillas et partes pectorales
et spongiositates sive carnositates
carnis glandose mamillarum.

Pronosticatio Si lac
valde superfluat in mamillis
retentionem inducit mamillas nisi mulie-
ri fuerint sanguinea et vene matricis
large. Retentio mamillarum periculo-
sior est in muliere non lactante quam
lac habente rustice et laboratrice
modicum lac generantur et propter
colicam vel mulierem propter siccitatem
complexionis et evacuationem multitudinis
Item dicit ypocras quarta parte aphorismorum mulieri
in utero habenti si subito i. infra
unam diem vel duas mamille
gratiles fiant i. lacte pervenientur et
extenuentur abortit quia sed defec-
tum nutrimenti fetus. Item ibidem
mulieri in utero habenti si altera
mamillarum gratilis fuerit geminos
habenti altum abortiet et si quidem
dextra gratilis fiat. Masculum
si vero sinistra feminam abor-
tiet et hec intelligenda plurimum quia
etiam femella quandoque generatur
in dextris et mas in sinistros
si epar matris sit naturaliter frigidum
et splen calidus. Item ibidem si
mulier que neque pregnans est ne-
que generat habet lac in mamillis
habens mamillas defecerunt. Item ibidem
mulieri in utero habenti lac ex ma-
millis multum fluens fetum sed
debilem si vero ubera dura fuerint
sanum sed fetum. Capitulum xiii.