Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8491
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

De Ruptura zifac Ramice et herna

si res que descendit fuerit intesti
num quod membranosum sunt
ipsum acutum Et tremor signum est
ex re que descendit per ut nunc
dicemus Omnis et ex signum
quod in ruptura zifac appar tu
mor et inflatio circa inguina
cum patiens stat erectus In hernia
vero non appar tumor neque in
flatio nisi circa bursam testiculorum
Signa vero propria rupture sunt
quod si eger iacet resupinatus super
pedes iacere et anchis supinitate
atque capite depresso et rem in os
sea contenta duxeris sursum per
digitum manibus comprimendo
reddidit aut tota aut pars eius non
difficulter multa et sine rugi
tu omnino vel pauco ita tamen ut
zirbus fuerit tumor testiculorum
et inflatio fiet mollior et sub
tilior antequam reducatur et dolor et ru
gitus minor Et si vero intestinum
fuerit tumor et inflatio fiet tan
gibilior et grossior et antequam redu
catur dolor et rugitus maior
Signa vero propria hernie sunt
quod si egrum resupinaveris
sicut prius et rem reduxeris re
dibit aut tota aut pars eius
cum facilitate et rugitu plurimo
vel mediocri ita tamen ut si ven
tosius fuerit fiet rugitus plurimus
antequam reducatur et tumor et infla
tio testiculorum dura que tactui
vix cedit et sonat cum tangitur
antequam reducatur Et si vero fuerit aquosi
tas fiet rugitus mediocris an
tequam reducatur et tumor et inflatio
testiculorum in mensa valde et
mollis splendens sicut facit
ydropicorum Et urina quam mingit
fiet pauca Et si vero fuerit humor
fecis quasi sit in carne ad tactum
propter res dura inter testiculos
et osseum mobilis fuerit tamen neque
reducitur quantumcumque comprimatur

Methadus Curacio rup
ture duplex est una quidem cum in
cisione et cauterio dicimus pene
trante et hec si fuerit difficilis
antiqua et habent cirologi de re
linquo Alia vero curatio est strip
tis constrictiis et hec si fuerit parva recens
facilis curacionis et hanc pro
posse dicemus Evacuentur igitur
a principio intestina ore cum sup
positoriis vel clisteri lenitivo in rec
to bis una die postea ponatur eger
in aqua dulci tepida tempore longo
donec dicimus et intestina fue
rint complete mollificata De
inde resupinetur super lecto suo
anchis elevatis et capite depresso
et reducat medicus strebium vel
intestinum sursum per digitum in re
trem paulatim parum post pa
rum donec totum reducatur Tunc
igitur ponat super locum rup
ture Emplastrum strictorium quod fit
thure mastice gummi arabico dragaganti
ana ʒ ii boli armeni sanguinis draconis albi
es mirre ana ʒ iii acacie gal
larum cipressi glandium psidie

Emplastrum strictivum.