Quelle: http://manuscripta.at/?ID=35138
Copyright: Brixen/Bressanone, Priesterseminar/Seminario Maggiore

duplo vel subduplis ita q̃ ponat. Si aut aliq̃ sint
residui qstat q̃ nullus ponto no fuit q̃dratus ꝑ di
gitus vltra ipsum sub duplo ⁊ radix maximi nu
q̃drati subnulli ponti iuncti. Si vel ipsi q̃ hac vt
bn scribs et multiplica digitum vltra iunctu ꝑ ipsum
tu subduplo vel subduplis ⁊ redibit ccd figure ꝑ
ꝑ hunsti si nichil residui fuit. Et si aliq̃ fuit
residui et cui addito residui ipsius nulli redibit
ccd figure quas ꝑ hunsti

Restat de radicibus extractis ⁊ hoc in nulis cubicis
Unde vided ⁊ q̃ sit nullus cubicus ⁊ q̃ sit cui
radix et q̃ sit radicis eius extrahere cubica. Restat ipsi
nullus cubicus sic ꝑ exponitur q̃ preter exducto a cuiq
nulli bis ipse vel semel ipsum q̃dratum radix nulli cubici
⁊ illa q̃ ita bis ducit ipse vel sel ipsum q̃dratum. Im
patz q̃ nullus cubicus ⁊ q̃dratus eadem radicis habet
sic supius dictum ⁊ radicis aut cubica extrahere ⁊ nulli
ponti radicis cubica ipsius si nullus ponto sit cubicus
et radicis cubici extrahere ⁊ maximi nulli cubici sub
nullo ponto greti radicis ipsius. Ponto ipsi nullus
aliq̃ cuius radicis cubica vel extrahere ꝑ ꝓprietate sint